

AD - SOYAD :
DOĞUM TARİHİ :

	Doğumda	1. ayın sonu	2. ayın sonu	4. ayın sonu	6. ayın sonu	12. ay	18-24 ay	48. ay	İlköğretim 8.sınıf
Hep B	I	II			III				
BCG			I						
DaBT-İPA-Hib			I	II	III		Rapel		
KPA			I	II		Rapel			
KKK						I		Rapel	
Su çiçeği						I			
Hepatit A							I ve II (6 ay ara ile)		
OPA					I		II		
DaBT-İPA								Rapel	
Td									Rapel

Aşılar	Aşılamaya başlama yaşı	2. ayın sonu	3. ayın sonu	4. ayın sonu	5. ayın sonu	6. ayın sonu	7. ayın sonu	9. ayın sonu	12. ayın sonu	14. ayın sonu	15. ayın sonu	24. ayın sonu	26. ayın sonu	10 yaş	10 yaş 1 ay	10 yaş 1 ay-18 yaş
Nimenrix	2-6 ay arası 7-11 ay arası ≥12 ay	I. ve II. dozlar							III							
Menveo	2-6 ay arası 7-11 ay arası 12-23 ay arası ≥24 ay	I., II. ve III dozlar							IV							
Menactra	9-11 ay arası 12-23 ay arası ≥24 ay							I	II							
Menquadfi	12. aydan sonra tek doz.															

Aşılar	Aşılamaya başlama yaşı	2. ayın sonu	3. ayın sonu	4. ayın sonu	5. ayın sonu	6. ayın sonu	7. ayın sonu	9. ayın sonu	12. ayın sonu	14. ayın sonu	15. ayın sonu	24. ayın sonu	26. ayın sonu	10 yaş	10 yaş 1 ay	10 yaş 1 ay-18 yaş
Bexsero	2-11 ay arası 12-23 ay arası 2-10 yaş >10 yaş															
										I	II		III			
													I. ve II. doz			
																I. ve II. doz

Aşılar	2. ayın sonu	3. ayın sonu	4. ayın sonu	5. ayın sonu	6. ayın sonu	7. ayın sonu	9. ayın sonu	12. ayın sonu	14. ayın sonu	15. ayın sonu	24. ayın sonu	26. ayın sonu	7 yaş	9 yaş	10 yaş	10 yaş 1 ay	11 yaş	12 yaş	13 yaş	14 yaş	15-18 yaş	
Rotarix ¹	I		II																			
Rotateq ¹	I		II		III																	
HPV ²																						I, II ve III. doz
İnfluenza ³									Her yıl		Her yıl											Her yıl
Tdap ⁴																						I.

Nimenrix: İlk 2 dozun arası en az 2 ay olmalıdır. 3. yani son doz ise 12 ay ve sonrasında yapılmalıdır.

Menveo: İlk 3 doz arasında 2'şer ay bırakılıp, son doz 12. aydan sonra uygulanır

Menactra: İlk doz en erken 9 aylıkken yapılmalıdır, dozlar arasında en az 3 ay olmalıdır.

Bexsero: İlk 2 dozun arası en az 2 ay olmalıdır. 3. yani son doz ise 12 ay ve sonrasında yapılmalıdır.

Rotarix/ Rotateq: İlk doz en az 6 haftadan sonra en çok 14 hafta 6 günlüğe kadar yapılmalıdır. Dozlar arası en az 4 hafta olmalıdır. Son doz Rotarix için 24. haftaya, Rotateq için 32. haftaya kadar uygulanmalıdır.

HPV: Kız / erkek çocuklarda 9-14 yaş arası 6 ay ara ile 2 doz önerilir. 15 yaşından sonraki aşılama 0-2-6 ay olmak üzere 3 doz uygulanır. 9 etkenli HPV aşısında çalışmalar 9-26 yaş arası erkeklerde ve 9-45 yaş arası kadınlarda yapılmıştır.

İnfluenza: İlk aşı için 6 aydan büyük çocuklarda 9 yaşına kadar 1 ay arayla 2 tam doz, devamında her sene 1 doz uygulanmalıdır. 9 yaşından sonra sene 1 doz şeklinde devam edilir.

Tdap: 13 yaş Tp ve 10 sene 1 rapel Td yerine Tdap uygulanır.

*Yetişkinler için risk grubunda pnömokok aşılması Kpa ile başlar 1 yıl sonra (ağır risk gruplarında 8 hafta sonra) PPA23 ile devam edilir.

*Bağışıklama Danışma Kurulu (BDK) tarafından, 9 ay ve üzerinde ve 12 aydan küçük olan tüm bebeklere ilave bir doz kızamık aşısı uygulanmasına, 12. ayı doldurdularında ise (bir önceki kızamık içeren aşı dozu ile arasında en az dört hafta olacak şekilde) rutin KKK aşısı dozunun uygulanmasına karar verilmiştir.

